



RIKTLINJER FÖR BARNENS VISTELSE I FÖRSKOLAN I SAMBAND MED SJUKDOM

ALLMÄNT

Efter sjukdom ska barnet vara feberfritt och allmänna hälsotillståndet gott innan barnet återgår till förskolan.

När barnet kommer tillbaka till förskolan måste hon/han kunna delta i alla aktiviteter såväl ute som inne.

MEDICINER

Mediciner ges inte på förskolan med undantag av allergimedieiner och andra långvariga medicinska behandlingar (t.ex. diabetes).

MAGSJUKA

Barn kan återgå till förskolan när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under 2 dygn.

VATTKOPPOR

Virusinfektion med stor smittsamhet. Börjar som blåsor som sedan torkar till skorpor. Smittfri när alla koppor är torkade. Barnet ska stanna hemma tills allmäntillståndet är gott och vattkopporerna torkat.

MOLLUSKER

Vårtliknande virus, smittar framför allt bland barn före puberteten. Försvinner av sig själv inom 1-2 år utan behandling. Barnet kan vara på förskolan.

FÖRKYLNINGAR

I början av en förkylning när näsa och ögon rinner är barnet som mest smittsamt och bör vara hemma.

Efter feber bör barnet vara hemma en feberfri dag. När barnet är piggt och feberfritt kan det återkomma även med snuva. Det är personalen i samråd med föräldrarna som avgör om barnet orkar delta i förskolans verksamhet.

HALSFLUSS SCHARLAKANSFEBER

Bakterieinfektion som ska behandlas med penicillin. Stor smittsamhet.

Får komma till förskolan först efter 2 dagars penicillinbehandling och om barnet orkar med det vanliga tempot i barngruppen. Om flera barn drabbas kontakta BVC för vidare råd.

SPRINGMASK

5-10 mm sytrådsliknande maskar som kan ses i avföringen och ändtarmsöppningen. Endast den person som har konstaterad springmask ska behandlas med Vanquin, som finns receptfritt på apoteket. Noggrann handhygien, med kortklippta naglar förhindrar smitta. Undvik sötaker vid om barnet har springmask. Barnet kan vara på förskolan efter behandling.

ÖGONINFLAMMATIONER

Förkylningsvirus infekterar ofta även ögonen. I regel behövs ingen behandling och problemen går över samtidigt med förkylningen i övrigt. Bara om barnet har kladdiga och röda ögon bör barnet hållas hemma. Vid långvariga problem, mer än en vecka, rådfråga BVC eller husläkare.

SVINKOPPOR IMPETIGO

Samma bakterie som vid halsfluss. Sätter sig som sår framför allt runt mun och näsa, men även runt nagelband eller öppna sår. Ska behandlas med Alsolsprit och penicillinsalva, ev. tabletter. Barnet ska stanna hemma tills utslagen torkat.

HUVUDLÖSS

Smittar genom närkontakt. Barn med huvudlöss ska behandlas hemma med apotekets receptfria preparat. Följ bruksanvisningen noga. Endast de barn och familjemedlemmar som har huvudlöss ska behandlas. Barnet kan vara på förskolan när det behandlats.